

## ДЕФОРМІВНИЙ АРТРОЗ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА.

Сергієнко Р.О.

ДУ «ІТО АМН України», м.Київ

**Актуальність проблеми:** Хронічний біль та порушення функції плечового суглоба турбують до 60 % людей віком, старше 40 років . Причинами даних страждань вважають велику кількість різнопланової патології: остеохондроз шийного відділу хребта, плече лопатковий периартрит, нейродистрофічні синдроми, адгезивний капсуліт і т. ін.. З іншого боку діагноз остеоартрозу плечового суглоба (ОАПС) зустрічається виключно рідко.

**Матеріали і методи.** За період з 2003 по 2013 роки 297 пацієнтів були прооперовані з приводу хронічного больового синдрому плеча без зв'язку з травмою. Групу спостереження склали 177 жінок, 120 чоловіків. Середній вік - 56 років. Всі хворі досліджувались за однаковим протоколом, за допомогою клінічного, сонографічного, рентгенологічного методів, магніторезонансної томографії та діагностичної артроскопії.

**Результати.** Під час артроскопічного дослідження у хворих виявлені різні типи ураження плечового суглоба, проте всі вони мали основні ознаки деформівного артрозу, а саме - дегенерацію суглобового хряща плечелопаткового суглоба та синовіїт. Як відомо, остеоартроз (ОА) –характеризується дегенерацією хряща, структурними змінами субхондральної кістки та явним чи прихованим синовіїтом. Таким чином, у хворих всіх груп був наявний деформівний артроз плечелопаткового суглоба.

**Висновки.** Розвиток деформівного артрозу плечового суглоба треба розглядати в контексті плечового суглобового комплексу. Розвиток деформівного артрозу в плечовому суглобі, як суглобі з найбільшим ступенем свободи має свої особливості і в великій мірі залежить від стану пасивних і активних стабілізаторів. Раннім проявом остеоартрозу є синдром субакроміального конфлікту плеча.