

**ПРИЧИННІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ЛЕТАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПЕРЕБІГУ
ТРАВМАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ПОСТРАЖДАЛИХ З ПОЛІТРАВМОЮ З
НАЯВНІСТЮ СКЕЛЕТНОГО КОМПОНЕНТА ПОШКОДЖЕННЯ**
Гур'єв С.О., Філь А.Ю.

Проблема політравми в сучасному світі є однією з найактуальніших та поширених, особливо в ракурсі дорожньо-транспортного травматизму

За даними ВООЗ щорічно постраждалими від полі травми є близько 1,2 млн людей, а також 50 млн отримують переломи та залишаються інвалідами. На першому місці серед причин летальності серцево-судинні захворювання, на другому – онкологічні захворювання, на третьому – травми . Але середній вік померлих від серцевосудинних захворювань 79 років, від онкозахворювань – 68,6 років, від травм – 34,4 років. В промислово-розвинутих країнах травма є основною причиною смерті людей у віці до 40 років. За даними різних авторів середній вік пацієнта з політравмою припадає до 38,5 років.

За нашими даними (293 випадки) найбільш часто при полі травмі зустрічається черепномозкова травма. Дуже часто вона поєднується з пошкодженнями хребта та грудної клітки і становить приблизно 70% (середній вік постраждалих 28 років). Приблизно в 15% випадків при травмі пошкоджується до трьох порожнин : череп, грудна та черевна (середній вік постраждалих 41 рік), у 60 % постраждалих разом з ушкодженням кісток скелету (середній вік постраждалих 33 роки).