

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В НЕВРОЛОГІЧНОМУ ТА СОМАТИЧНОМУ СТАТУСІ У ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

Юрик О.Є., Юрик Н.Є., Франчук О.С.

ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ

Ключові слова: ревматоїдний артрит, передопераційне обстеження.

Вступ: Ревматоїдний артрит відноситься до складних аутоімунних захворювань, котрий досить часто потребує ортопедичної корекції.

Метою наших досліджень було поглиблене клінічне обстеження таких пацієнтів на етапі їхньої передопераційної підготовки.

Матеріал та методи: Ревматоїдний артрит діагностовано у 61 особи. Осіб чоловічої статі було 14, жіночої – 47. Розподіл хворих за віком в підгрупах був таким: у 13 % випадків захворювання спостерігалось у дітей, у 59 % – в молодому віці, у 18 % – в середньому та 10 % – в похилому віці.

Результати: При детальному клінічному обстеженні нами були виявлені такі зміни в діяльності нервової системи. У 7 дітей з ревматоїдним артритом спостерігались ознаки нейро-ендокринно-обмінної форми гіпоталамічного синдрому. У 3 хворих в юнацькому віці були виявлені ознаки ревмоваскуліту з ураженням структур нервової системи. Причому ці прояви супроводжувались не лише вираженими інтенсивним головним болем, головокружінням, запамороченням, але і зниженням пам'яті та розумової працездатності, а у 1 дівчини – епілептиформним синдромом. У 17 осіб молодого віку явища ревмоваскуліту супроводжувались м'яко вираженими ознаками дистальної сенсорної полінейропатії та явищами остеопорозу кісток кистей або ступнів. Явища монокорінцевої симптоматики діагностовані у 23 осіб: у 7 – в шийному, у 4 – в грудному і у 12 – в попереково-крижовому відділах хребта, а у 11 – спостерігався полірадікулярний синдром.

Як показали проведені дослідження, у 12 пацієнтів з ревматоїдним артритом діагностувалась хронічна інтерстеціальна пневмонія з частими рецидивами в період загострення артриту. Особливістю протікання пневмонії у цієї групи хворих був швидкий регрес клінічної симптоматики під впливом кортикостероїдної терапії та мала ефективність від застосування антибіотикотерапії. У 17 хворих

діагностований плеврит. Він протікав у вигляді сухого (11 хворих) або ексудативного (у 6 хворих) плевриту. У 1 пацієнта поєднувався з перикардитом. У 12 пацієнтів діагностувалась міокардіодистрофія. Ураження печінки спостерігались у 9 хворих з неспецифічними запальними захворюваннями суглобів. Зміни із боку нирок спостерігались у 14 хворих. Вони проявлялись незначною, але стійкою протеїнурією та мікрогематурією. Сечовий залишок був в нормі або незначно зміненим. У 3 хворих з цією патологією спостерігались незначні периферичні набряки.

Висновки: Таким чином, передопераційна підготовка пацієнтів з ортопедичними ускладненнями ревматоїдного артриту потребує зваженої корекції у них неврологічного та соматичного статусу.